

Lodde ved Island, Øst-Grønland og Jan Mayen

Forvaltningsplan: Fisket blir forvaltet i henhold til en todelt beskatningsregel, som tar sikte på at minst 400 000 t av den modnende bestanden får gyte ved slutten av fiskesesongen. Det utarbeides i mai et kvoteråd for hele sesongen (som strekker seg fra juli et år til mars året etter), og ved begynnelsen av sesongen settes en foreløpig kvote lik 2/3 av den totale kvoten. Basert på nye undersøkelser under innsiget om høsten og vinteren justeres så kvoten slik at forvaltningsplanen blir oppfylt.

Status: Gytebestanden er høyst variabel fordi den baserer seg på kun to årsklasser. Gytebestanden vinteren 2003 er beregnet til å være 410 000 t, dvs på det nivået som er ansett å være tilstrekkelig for å kunne oppnå tilfredsstillende rekruttering.

Forvaltningsråd: For å sikre en gytebestand på minst 400 000 t i mars 2004, anbefaler ICES at TAC for første del av 2003/2004-sesongen ikke bør overstige 555 000 t. Dette er 2/3 av den totale fangsten på 835 000 t prognostisert for hele sesongen.

Selv om sommer/høst-sesongen 2003 kan åpnes 20. juni, anbefaler ICES at områder med stor tetthet av unglodde bør stenges for kommersielt fiske for å hindre høsting av en stor andel umoden lodde.

ICES anbefaler videre at data fra toktene i november 2003 og/eller januar-februar 2004 blir brukt til å fastsette den endelige TAC for sesongen 2003/2004.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen:

Kritisk gytebestandsnivå (B_{lim}) = 400 000 tonn

Føre-var-gytebestandsnivå (B_{pa}) = Ikke relevant

Føre-var-fiskedødelighetsnivå (F_{pa}) = Ikke relevant

Ventede landinger i sesongen 2003/2004: 830 000 tonn

Ventet gytebestand i 2004: 400 000 mill. tonn

Foreløpig anbefalt TAC for hele sesongen 2002/2003: 1 040 000 tonn

Avtalt TAC for hele sesongen 2002/2003, basert på undersøkelser gjennom sesongen: 1 000 000 tonn

Fangst hele sesongen 2002/2003: 985 000 tonn