

3.4.3 Hvitting

ICES mener fangstene av hvitting i Nordsjøen ikke bør overstige 17.300 tonn. Norge og EU er blitt enige om en totalkvote for 2006 på 23.800 tonn.

Odd Smedstad

odd.smedstad@imr.no

Fisket

Utbyttet av hvitting har vært stabilt de siste ti årene, men det er betydelig lavere enn i perioden 1960–1980. Skottland tar om lag en tredjedel av totalfangsten. De norske landingene er hovedsakelig bifangst i industritrålfisket. Norge hadde en kvote på 2.800 tonn i 2005, mens foreløpige tall indikerer en fangst i underkant av 100 tonn.

Bestandsgrunnlaget

Mens nesten alle analyser med fangstdata indikerer at bestanden er godt under kritisk nivå, indikerer toktene at bestanden er økende og i god forfatning. Denne motstridende informasjonen om bestandsstørrelsen gjør det umulig å evaluere gytebestand og fiskedødelighet.

Anbefalte reguleringer

I lys av problemene med bestandsberegningene mener ICES at fangsten i 2005 ikke bør overstige gjennomsnittet for 2002–2004 på 17.300 tonn i Nordsjøen og østlig del av Den engelske kanal. Det bør innføres tiltak

som kan redusere bifangst av torsk i fisket etter andre arter og hindre utkast og feilrapportering av torsk i alle fiskerier.

Norge og EU er blitt enige om en totalkvote for 2006 på 23.800 tonn hvitting, hvorav Norge disponerer 2.380 tonn. Alt dette kan fiskes i EU-sonen.

Whiting

The available information is inadequate to evaluate spawning stock or fishing mortality. Nearly all catch at age analyses indicate that the stock is at or near the lowest observed level, and below B_{lim} . However, all survey-based analyses indicate that the stock is at or near the highest observed level, and stable or increasing.

In the light of the inconsistencies in the assessments, ICES recommends that human consumption landings in 2006 should not be allowed to increase above the recent average (2002–2004) of 17,300 for the North Sea and Eastern Channel. Norway and EU agreed on a TAC for 2006 of 23,800 tonnes.



HVITTING

Merlangius merlangus

- ▶ Hvitting har sin utbredelse i Atlanteren fra Gibraltar til Barentshavet. Finnes langs hele norskekysten, men vanligst nord til Stad. Hvittingen er en bunnfisk som trives på sand- og mudderbunn fra 10–200 m, og den vandrer ofte inn på grunt vann om natten.

Hvitting er lys i fargen med en mørk flekk ved brystfinnen. Den har tilspisset snute, og voksne individer mangler skjeggtråd. Ryggsiden er svakt brun, men fisken er ellers sølvglinsende med hvit buk. Den kan bli opptil 55 cm lang.

Gytingen foregår fra januar til juli, med størst aktivitet i mars–april da den samler seg i store stimer. Fiskekjøttet er hvitt og fint.

Tabell 3.4.3.1

Hvitting i Nordsjøen. Landinger i tusen tonn (ICES IV), 1995–2004.

Whiting. Landings (thousand tonnes) from the North Sea, ICES area IV, 1995–2004.

| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 ¹ | 2004 ¹ |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|
| Belgia | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Danmark | 0,4 | 0,2 | 0,1 | + | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tyskland | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Frankrike | 6,0 | 4,71 | 3,5 | 1,9 | 4,3 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 2,4 | |
| Færøyane | + | - | + | + | + | - | | | | |
| Nederland | 3,6 | 3,4 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 1,4 | 1,0 |
| Norge | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Storbr. (Engl.) | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,2 |
| Storbr. (Skottl.) | 27,8 | 23,4 | 22,1 | 16,7 | 17,2 | 17,2 | 10,6 | 7,8 | 5,7 | 5,1 |
| Sverige | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Konsum | 41,4 | 35,1 | 31,6 | 23,9 | 26,4 | 24,5 | 18,8 | 15,6 | 11,0 | 7,8 |
| Arb. gruppe total | 98,0 | 69,0 | 54,5 | 39,7 | 54,7 | 55,3 | 43,3 | 40,8 | 37,5 | * |

¹inkl. utkast. * Ikke tilgjengelig.