

Rødspette



Status og råd

Ifølge ICES er bestanden i god forfatning og høstes bærekraftig. Gytebestanden er økende og godt over føre-var-nivået. Fiskedødeligheten er avtagende og under føre-var-nivået. Rekrutteringen har i senere år vært litt under middels. ICES anbefaler en kvote (konsumlandinger) på 63 825 tonn som er i henhold til EUs forvaltningsplan.

Fiskeri


Av totalkvoten i Nordsjøen disponerer EU 93 prosent og Norge 7 prosent. Det er ikke vedtatt noen felles forvaltningsplan for bestanden, men det er enighet om å utvikle en felles plan.

I 2008 var totalkvoten 49 000 tonn, og landingene var 47 682 tonn, men i tillegg kom et utkast på litt over 47 000 tonn (figur). Norge hadde en kvote på 1 105 tonn og fisket 1 051 tonn. For 2009 var kvoten 55 500 tonn. Offisielle landinger i 2009 var ca. 12 000 tonn, hvorav Norge tok ca. 10 tonn.

Totalkvoten for 2010 er satt til 63 825 tonn i Nordsjøen og 4 268 tonn i Skagerrak. Av dette utgjør norsk kvote henholdsvis 4 268 og 187 tonn.

Rødspette blir i stor grad fisket sammen med tunge, og regnes da ofte som bifangst. Nederland dominerer fisket, men også Danmark, Belgia og Tyskland tar betydelige fangster.

Rødspette i Nordsjøen



Utvikling av rapportert fangst av rødspette i Nordsjøen. Norsk fangst er så liten at den ikke synes i figuren.

I NORDSJØEN

Rødspette – *Pleuronectes platessa*

Familie: Torskfamilien (Pleuronectidae)

Andre navn: Flyndre

Maks størrelse: 0,5 m og 1 kg

Levetid: 20 år

Leveområde: Nordsjøen

Gyteområde: Sentrale og sørlige Nordsjøen

Gytetidspunkt: Januar–februar

Føde: Bunnedyr

Nøkkeltall:

KVOTERÅD FOR 2010: 63 825 tonn

TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2010:

68 093 tonn/4 455 tonn

TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2009:

17 850 tonn/1 785 tonn

TOTALFANGST/NORSK FANGST 2009:

12 000 tonn/10 tonn



Fakta om bestanden:

Gytefeltene er i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen. De yngste individene er konsentrert i grunne kystfarvann, særlig i den østlige delen. Som vanlig hos flatfisk vokser hunnen mye raskere enn hannen og blir betydelig større. Kjønnsmodningen inntreer vanligvis ved 2–3-årsalder, og senere for hunner enn for hanner.

Voksen rødspette vandrer hvert år mellom gyteområder i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen og beiteområder noe lenger nord. Det er påvist at i hvert fall deler av denne vandringen foregår pelagisk.

Rødspette finnes i det østlige Atlanterhav fra Barentshavet i nord og sørover til Middelhavet og nordvestkysten av Afrika. Den er oppdelt i en rekke bestander, og bestanden i Nordsjøen er den klart største. Den finnes ned til ca. 200 m, og kan bli opptil 1 meter og 7 kilo, men i Nordsjøen er den sjelden over et ½ kilo og 40 cm.

Kontaktperson: Tore Jakobsen | tore.jakobsen@imr.no