

2.3.5 Pelagisk snabeluer i Irmingerhavet

Flere tokt i løpet av de siste fem årene har vist at mengden av pelagiske snabeluer i Irmingerhavet nå bare er ca. 1/5 av hva den var for ti år siden. Den offisielle fangststatistikken viser også lave fangster. Internasjonalt klarer man ikke å enes om fangstkvoter på det nivået ICES mener er riktig for å stoppe bestandsnedgangen.

Kjell Nedreaas

kjell.nedreaas@imr.no

Norske trålere har fisket snabeluer i internasjonalt farvann i Irmingerhavet sørvest av Island siden 1990. Denne ueren er en egen oseanisk og pelagisk bestand (sannsynligvis sammensatt av to–tre bestander) og fiskes med flytetrål på 100–900 meters dyp over et bunndyp på 1500–3000 meter. På det meste (i 1996) er det internasjonalt totalt fisket 180.000 tonn, og opp til 19 nasjoner har deltatt. Norske fiskere har på det meste fisket vel 14.500 tonn (i 1992 og 1993). Foreløpige tall for 2005 viser en totalfangst på 68.771 tonn. Dette er en nedgang fra 112.761 tonn i 2004. Den norske fangsten i 2005 var på 4.926 tonn. Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) satte totalkvoten for 2005 til 75.200 tonn etter at ICES hadde anbefalt å begrense fangsten til 41.000 tonn.

Denne (eller disse) snabeluer bestanden(e) er på grunn av sin sene kjønnsmodning og lave vekstrate svært følsom overfor beskatningen. Grunnere enn 500 meter har akustiske toktmålinger vist reduserte mengder av pelagisk snabeluer siden 1991–1995. Det siste toktet i 2005 viste at målingene som ble gjort i 2003 trolig var et underestimat, men at biomassen likevel bare er ca. 20 % av det den var for ti år siden. I dypere lag, hvor man ikke har tidsserier av akustiske toktmålinger, indikerer imidlertid også reduserte fangstrater i toktene en redusert bestand, selv om fangstratene i det kommersielle fisket har holdt seg på samme nivå siden midt på 1990-tallet.

ICES mener at dersom man skal høste denne bestanden bærekraftig, må man årlig ikke ta ut mer enn 5 % av den fiskbare bestanden i havet. Mye tyder på at høstingsnivået over tid har ligget på over 20 %. I sin rådgivning legger ICES mest vekt på de fiskeriuavhengige toktresultatene og anbefaler for 2006 at fangstene ikke overstiger fangstnivået i 1989–1992 hvis man ønsker å hindre ytterligere bestandsnedgang. Dette tilsvarer en fangst på under 41.000 tonn. NEAFC har satt kvoten for 2006 til 62.416 tonn, hvorav inntil 80 % kan fiskes før 1. juli.



Snabeluer. Foto: Monika Blikas



Foto: Jan de Lange

Pelagic *Sebastes mentella* in the Irminger Sea

Stock status is based mainly on the perception of stock trends derived from survey indices. The internationally coordinated acoustic-trawl survey June/July 2005 indicates that the stock size is low compared to that in the early 1990s. ICES advises for

2006 that catches should not exceed catches exerted in the period 1989–1992, corresponding to less than 41,000 tonnes. The countries participating in this fishery have, however, not succeeded in agreeing on catch quotas corresponding to this recommended level.