

Rødspette



Foto: Ingunn E. Bakkevig

Status og råd

Ifølge ICES er bestanden i god forfatning og høstes bærekraftig. Gytebestanden er over det dobbelte av føre-var-grensen og har nådd et rekordhøyt nivå, mens fiskedødeligheten er langt under føre-var-nivået. Rekrutteringen har i senere år vært stabil på omkring middels nivå. ICES anbefaler en kvote (konsumlandinger) på 97 070 tonn basert på EUs forvaltningsplan.


Fiskeri

Av totalkvoten i Nordsjøen disponerer EU 93 % og Norge 7 %. Det er startet en prosess for å utvikle en felles forvaltningsplan for bestanden, og man er enig om hovedprinsippene. Rødspette i Skagerrak behandles som en egen bestand, men det er ingen bestandsanalyser.

I 2011 var totalkvoten 73 400 tonn og landingene var ca. 67 000 tonn, men i tillegg kom et utkast på litt over 40 000 tonn. Norge fisket bare 3 tonn. For 2012 var kvoten 84 410 tonn, herav 5 909 tonn til Norge.

Totalkvoten for 2013 er satt til 97 070 tonn i Nordsjøen og 9 142 tonn i Skagerrak. Av dette utgjør norsk kvote henholdsvis 6 795 og 183 tonn.

Rødspette blir i stor grad fisket sammen med tunge, og regnes da ofte som bifangst. Nederland dominerer fisket, men også Danmark og Tyskland tar betydelige fangster.



Utvikling av rapportert fangst av rødspette i Nordsjøen.

Norsk fangst er så liten at den ikke synes i figuren.

Reported catch of European plaice in the North Sea.
Norwegian catches are too small to show in the figure.

I NORDSJØEN

Rødspette – *Pleuronectes platessa*

Familie: Pleuronectidae (flyndrefamilien)

Andre navn: Flyndre

Maks størrelse: 0,5 m og 1 kg

Levetid: 20 år

Leveområde: Nordsjøen

Gyteområde: Sentrale og sørlige Nordsjøen

Gytetidspunkt: Januar–februar

Føde: Bunnedyr

Nøkkeltall:

KVOTERÅD FOR 2013: 97 070 tonn

TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2013:

97 070 tonn/6 795 tonn

TOTALFANGST/NORSK FANGST 2011:

67 386/3 tonn

NORSK FANGSTVERDI 2011: Ca. 0,1 mill. kroner



Fakta om bestanden:

Gytefeltene er i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen. De yngste individene er konsentrert i grunne kystfarvann, særlig i den østlige delen. Som vanlig hos flatfisk vokser hunnen mye raskere enn hannen og blir betydelig større. Kjønnsmodningen inntreer vanligvis ved 2–3-årsalder, og senere for hunner enn for hanner.

Voksen rødspette vandrer hvert år mellom gyteområder i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen og beiteområder noe lenger nord. Det er påvist at i hvert fall deler av denne vandringen foregår pelagisk.

Rødspette finnes i det østlige Atlanterhav fra Barentshavet i nord og sørover til Middelhavet og nordvestkysten av Afrika. Den er oppdelt i en rekke bestander, og bestanden i Nordsjøen er den klart største. Den finnes ned til ca. 200 m, og kan bli opptil 1 meter og 7 kilo, men i Nordsjøen er den sjelden over 0,5 kilo og 40 cm.